SURVIE : LES CHIFFRES CLÉS

CANCER DE LA PROSTATE

Sources : INCa, InVS,Francim, HCL

NOUVEAUX CAS EN 2011

♂ 53 900

ÉVOLUTION DE LA SURVIE NETTE STANDARDISÉE à 5 ans

SURVIE NETTE STANDARDISÉE entre 1989 et 2010

SURVIE NETTE À 15 ANS SELON L'ÂGE sur la période 1989-1998



CANCER DU SEIN

Sources : INCa, InVS,Francim, HCL

NOUVEAUX CAS EN 2012

♀ 48 800

ÉVOLUTION DE LA SURVIE NETTE STANDARDISÉE à 5 ans



SURVIE NETTE STANDARDISÉE entre 1989 et 2010



SURVIE NETTE À 15 ANS SELON L'ÂGE sur la période 1989-1998



CANCER COLORECTAL

Sources : INCa, InVS,Francim, HCL

NOUVEAUX CAS EN 2012

♂ 23 200
♀ 18 950

ÉVOLUTION DE LA SURVIE NETTE STANDARDISÉE à 5 ans

SURVIE NETTE STANDARDISÉE entre 1989 et 2010



SURVIE NETTE À 15 ANS SELON L'ÂGE sur la période 1989-1998



CANCER DU POUMON

Sources : INCa, InVS,Francim, HCL

NOUVEAUX CAS EN 2012

♂ 28 200
♀ 11 300

ÉVOLUTION DE LA SURVIE NETTE STANDARDISÉE à 5 ans



SURVIE NETTE STANDARDISÉE entre 1989 et 2010

SURVIE NETTE À 15 ANS SELON L'ÂGE sur la période 1989-1998



MÉLANOME CUTANÉ

Sources : INCa, InVS,Francim, HCL

NOUVEAUX CAS EN 2012

♂ 5 500
♀ 5 700

ÉVOLUTION DE LA SURVIE NETTE STANDARDISÉE à 5 ans



SURVIE NETTE STANDARDISÉE entre 1989 et 2010

SURVIE NETTE À 15 ANS SELON L'ÂGE sur la période 1989-1998



CANCER DE LA THYROÏDE

Sources : INCa, InVS,Francim, HCL

NOUVEAUX CAS EN 2012

♂ 2 300
♀ 5 900

ÉVOLUTION DE LA SURVIE NETTE STANDARDISÉE à 5 ans



SURVIE NETTE STANDARDISÉE entre 1989 et 2010



SURVIE NETTE À 15 ANS SELON L'ÂGE sur la période 1989-1998



InVS INSTITUT DE VEILLE SANITAIRE

Registres des cancers FRANCIM

Hôpitaux de Lyon

INSTITUT NATIONAL DU CANCER

MYÉLOME MULTIPLE ET PLASMOCYTOME

Sources : INCa, InVS,Francim, HCL

NOUVEAUX CAS EN 2012

♂ 2 600

♀ 2 300

ÉVOLUTION DE LA SURVIE NETTE STANDARDISÉE à 5 ans



SURVIE NETTE STANDARDISÉE entre 1995 et 2010

SURVIE NETTE À 15 ANS SELON L'ÂGE sur la période 1995 -1998



LEUCÉMIE LYMPHOÏDE CHRONIQUE LYMPHOME LYMPHOCYTIQUE

Sources : INCa, InVS,Francim, HCL

NOUVEAUX CAS EN 2012

♂ 2 700

♀ 1 800

ÉVOLUTION DE LA SURVIE NETTE STANDARDISÉE à 5 ans



SURVIE NETTE STANDARDISÉE entre 1989 et 2010



SURVIE NETTE À 15 ANS SELON L'ÂGE sur la période 1989-1998



LYMPHOME DIFFUS À GRANDES CELLULES B

Sources : INCa, InVS,Francim, HCL

NOUVEAUX CAS EN 2012

♂ 2 500

♀ 1 600

ÉVOLUTION DE LA SURVIE NETTE STANDARDISÉE à 5 ans



SURVIE NETTE STANDARDISÉE entre 1995 et 2010

SURVIE NETTE À 15 ANS SELON L'ÂGE sur la période 1995-1998



LYMPHOME DE HODGKIN

Sources : INCa, InVS,Francim, HCL

NOUVEAUX CAS EN 2012

♂ 1 000

♀ 850

ÉVOLUTION DE LA SURVIE NETTE STANDARDISÉE à 5 ans



SURVIE NETTE STANDARDISÉE entre 1989 et 2010



SURVIE NETTE À 15 ANS SELON L'ÂGE sur la période 1989-1998



CANCER DU TESTICULE

Sources : INCa, InVS,Francim, HCL

NOUVEAUX CAS EN 2012

♂ 2 300

ÉVOLUTION DE LA SURVIE NETTE STANDARDISÉE à 5 ans



SURVIE NETTE STANDARDISÉE entre 1989 et 2010

SURVIE NETTE À 15 ANS SELON L'ÂGE sur la période 1989-1998

* pour des raisons méthodologiques, la survie nette à 15 ans reprend la valeur observée à 10 ans.

CANCER DU COL DE L'UTÉRUS

Sources : INCa, InVS,Francim, HCL

NOUVEAUX CAS EN 2012

♀ 3 000

ÉVOLUTION DE LA SURVIE NETTE STANDARDISÉE à 5 ans



SURVIE NETTE STANDARDISÉE entre 1989 et 2010



SURVIE NETTE À 15 ANS SELON L'ÂGE sur la période 1989-1998



* Effet paradoxal du dépistage par frottis. Cf. page 3 du communiqué de presse : « Les nouvelles données sur la survie des personnes atteintes de cancers en France métropolitaine »

DÉFINITIONS

SURVIE NETTE

La survie nette est la survie qui serait observée si la seule cause de décès des personnes était le cancer ; c' est un indicateur épidémiologique important car, en s'affranchissant des éventuelles variations de mortalité liées aux autres causes de décès, elle permet des comparaisons dans le temps pour un même pays et entre pays.

INCIDENCE

L'incidence des cancers quantifie la fréquence de survenue de cette maladie. Elle s'exprime principalement de deux façons : en « nombre de nouveaux cas annuels » dans une population ou en « taux annuel d'incidence standardisé », c'est-à-dire en nombre de nouveaux cas durant une année pour 100 000 personnes ayant une structure d'âge donnée.

PRÉVALENCE

La prévalence totale des cancers correspond au nombre (ou à la proportion) de personnes atteintes ou ayant été atteintes d'une pathologie cancéreuse et vivantes à une date donnée.

MORTALITÉ

La mortalité par cancer s'exprime principalement de deux façons : en « nombre annuel de décès par cancer » dans une population ou en « taux annuel de mortalité standardisé », c'est-à-dire en nombre de décès par cancer durant une année pour 100 000 personnes ayant une structure d'âge donnée.